



Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°9
23/04/2019



Animateurs filières

Céréales à paille

Philippe PENICHO

FREDON Limousin

ppenichou@fredon-limousin.fr

Suppléance : **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON Limousin**

ppenichou@fredon-limousin.fr

Oléagineux

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON Limousin**

ppenichou@fredon-limousin.fr

Directeur de publication

Dominique GRACIET

Président de la Chambre Régionale

Nouvelle-Aquitaine

Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES Cedex 2

accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service Régional

de l'Alimentation

Nouvelle-Aquitaine

22 Rue des Pénitents Blancs 87000

LIMOGES

Supervision site de Poitiers

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention

« extrait du bulletin de santé

du végétal Nouvelle-Aquitaine

Grandes cultures N°X

du JJ/MM/AA »



Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stades phénologiques :** « Floraison » (BBCH63) au stade « les 10 1ères siliques ont une longueur comprise entre 2 et 4 cm et les 10 1ères siliques ont une longueur supérieure à 4 cm » (G2G3- BBCH71 72)
- **Charançon des siliques :** les conditions climatiques de la fin de semaine (températures en baisse et pluie) seront moins favorables. Mais restez vigilant, les parcelles observées du réseau vont entrer dans la période de risque (stade de sensibilité - stade G2 - atteint).
- **Puceron :** restez vigilants, les infestations progressent généralement depuis les bordures.
- **Sclérotinia :** compte tenu des conditions climatiques et des résultats du kit, le risque existe à ce jour.

Céréales à paille

- **Stades phénologiques :** de « 1 nœud » (BBCH 31) à « Gonflement » (BBCH45).
- **Septoriose :** vigilance à partir du stade « 2 nœuds » sur variétés sensibles.
- **Rouille Jaune (Blé – Triticale) :** surveillance des variétés sensibles
- **Oïdium (Orge – Triticale - Blé) :** vigilance accrue sur variétés sensibles
- **Rhynchosporiose, rouille naine et helminthosporiose (orge) :** surveillance des variétés sensibles à partir d'1 nœud.
- **Rhynchosporiose (triticale) :** vigilance sur variétés sensibles

COLZA

Ce printemps, le réseau d'observations du colza est constitué de 9 parcelles : 5 en Haute-Vienne, 3 en Creuse et 1 en Corrèze. La parcelle de St Junien Les Combes a été retournée.

• Stades phénologiques et observations du réseau


Cette semaine, 7 parcelles du réseau ont été observées :

- 43 % sont au stade « Floraison » (BBCH63)
- 43 % sont au stade « chute des 1ers pétales, 10 premières siliques à la longueur < 2 cm » (G1 – BBCH70)
- 14 % sont au stade « les 10 1ères siliques ont une longueur comprise entre 2 et 4 cm et les 10 1ères siliques ont une longueur supérieure à 4 cm » (G2G3- BBCH71 72)

	semis	Variétés	Stade	Pucerons (colonies/m²)	Nombre Charançon des siliques / plantes	Charançon des siliques (cuvette)	Frequence (% plantes touchées)	
							Cylindrosporiose	Pseudocercospora
87-Nexon	24/08/2018	Temptation	G1	0	0	0	0%	0%
23-St Priest La Plaine	24/08/2018	ES Mambo	G1	0	0	3	0%	0%
87-Dompierre Les Eglises	24/08/2018	DK imaret						
19-St Jal La Forêt	24/08/2018	DK imaret	G1	0,4	0,16	5	0%	0%
23-Evaux Les Bains	25/08/2018	DK exception	Floraison	0	0	0	0%	0%
23-Bussière St Georges	28/08/2018	ES Mambo	Floraison	0	0	0	0%	0%
87-Séreilhac	31/08/2018	Temptation	G2 G3	0	0	1	0%	0%
87-St Junien Les Combes	06/09/2018	Temptation						
87-Berneuil	12/09/2018	Umberto	Floraison	0	0	0	5%	0%
87-Couzeix	17/09/2018	KWS Cristiano						

Des traitements insecticides réalisés ont pu avoir un impact sur une partie de ces résultats

Stade du colza (échelle BBCH)



Stade G1 et G4
Agrandir Agrandir

G- Formation des siliques

- **Stade G1 (65)** : chute des premiers pétales. Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm. La floraison des inflorescences secondaires commence à ce stade (voir ci-contre).
- **Stade G2 (71)** : les 10 premières siliques ont une longueur comprise entre 2 et 4 cm.
- **Stade G3 (72)** : les 10 premières siliques ont une longueur supérieure à 4 cm.
- **Stade G4 (73)** : les 10 premières siliques sont bosselées (voir ci-contre).
- **Stade G5 (81)** : grains colorés

• Charançons des siliques

Observations du réseau : il a été piégé 5 charançons des siliques sur la parcelle de Saint Jal La Forêt. Sur cette parcelle, on dénombre 0.16 Charançon des siliques par plante.

Données de modélisation : l'outil Expert (Terres Inovia) annonce le démarrage du vol des charançons des siliques au 21/03/2019. A ce jour (23/04/2019), 100 % des vols seraient survenus (selon données météorologiques de Châteauroux, Niort, Poitiers, Cognac).

Période de risque : du stade G2 (71) (10 premières siliques ont une longueur comprise entre 2 et 4 cm), au stade G4 (73) (10 premières siliques bosselées)

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, en moyenne.

Attention : Le comptage se fait sur des lots de plantes consécutives prises au hasard (4*5 plantes par exemple).

Évaluation du risque

Les conditions climatiques de la fin de semaine (températures en baisse et pluie) seront moins favorables. Mais restez vigilant, les parcelles observées du réseau vont entrer dans la période de risque (stade de sensibilité - stade G2 - atteint).

• Pucerons cendrés du chou

Dégâts occasionnés : prélèvements de nourriture (salive toxique), multiplication des insectes et extension des colonies qui nuisent à la formation des siliques.

Observations du réseau : 0.4 colonies/m² de pucerons en bordure de parcelle sont observées sur la parcelle de St Jal La Forêt.

Période de risque : de la reprise de végétation jusqu'au stade G4 (73) « 10 premières siliques bosselées ».

Seuil indicatif de risque : 2 colonies par m².

Évaluation du risque

Restez vigilants, les infestations progressent généralement depuis les bordures.

• Sclérotinia

Afin de lutter si nécessaire contre le sclérotinia, il est conseillé de bien repérer ce stade F1. Le stade G1, stade où une réflexion d'intervention peut être engagée, est atteint quelques jours après. Plus précisément, 100 degrés-jours (base 0°C) environ 6 à 10 jours séparent le stade F1 du stade G1.

Stade F1 (60)
Début floraison



50% des plantes présentent une fleur ouverte. La parcelle est à dominance verte

Stade G1 (65)
chute des premiers p étales



Les hampes secondaires commencent à fleurir. Les 10^{èmes} siliques sont formées sur la hampe principale avec une longueur inférieure à 2 cm. La parcelle est jaune.

6 à 10 jours selon les températures



Seuil indicatif de risque : le niveau de risque au champignon peut être évalué sur chaque parcelle, selon :

- Les indicateurs de pétales contaminés ;
- Le nombre de cultures sensibles dans la rotation ;
- Les attaques des années antérieures sur la parcelle ;
- Les conditions climatiques : humidité et température moyenne journalière d'au moins 12°C.

Indicateurs de pétales contaminés :

Le pourcentage de fleurs contaminées en début de floraison constitue un bon indicateur du risque sclérotinia. En effet, ce sont les pétales de fleurs contaminés qui acheminent la maladie sur les feuilles puis sur tiges.

Ce pourcentage est déterminé à l'aide de l'outil « Kit pétales » de Terres Inovia.

Interprétation des kits :

- Si moins de 30% de fleurs contaminées : le risque est faible.
- Au-delà de 30%, le seuil de nuisibilité est atteint et une vigilance particulière doit être observée sur les parcelles avec un historique sclérotinia et selon les conditions climatiques.

Résultats des kits limousins :

2 nouveaux résultats disponibles :

Site de Couzeix : **67.5 %** de fleurs contaminées.

Site de Bussière St Georges : **70 %** de fleurs contaminées.

Pour rappel les 6 résultats des 2 dernières semaines :

Site de Dompierre les Eglises : 7.5 % de fleurs contaminées.

Site de Berneuil : 22.5 % de fleurs contaminées.

Site de Nexon : **42.5 %** de fleurs contaminées.

Site de Séreilhac : **47.5 %** de fleurs contaminées.

Site d'Evaux Les Bains : **75 %** de fleurs contaminées.

Site de Saint Jal La Forêt : **82.5 %** de fleurs contaminées.

Évaluation du risque

Compte tenu des conditions climatiques et des résultats du kit, le risque existe à ce jour.

• **Cylindrosporiose**

Observations du réseau : On relève toujours la présence de cylindrosporiose sur 5% des plantes sur la parcelle de Berneuil.

Symptômes : Sur feuilles supérieures, symptômes de type brûlure correspondant à des taches beiges avec des déformations sévères du limbe des feuilles.

Sur tige, taches allongées d'aspect liégeux avec des fendillements transversaux, beige à brun clair à la montaison.



Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et lisez attentivement la note nationale BSV 2019 sur les abeilles


1. Dans les situations proches de la floraison, sur colza, en pleine floraison ou en période de production d'exsudats, utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d'abeilles » et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.
2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliquer dans certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles **mais reste potentiellement dangereux.**
3. **Il est formellement interdit de mélanger pyréthriinoïdes et triazoles ou imidazoles.** Si elles sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d'intervalle en appliquant l'insecticide pyréthriinoïde en premier.
4. N'intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage du produit.
5. **Afin d'assurer la pollinisation**, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles de multiplication de semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles. Limiter la dérive lors des traitements. **Veiller à informer le voisinage de la présence de ruches.**

[Pour en savoir plus](#) : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV « [Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les !](#) » sur les sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr

Céréales à paille

20 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine : 12 blés ; 6 orges et 2 triticales.

• Stades phénologiques




○ Comment sont notées les maladies du feuillage ?

Chaque étage foliaire complètement déployé (F1 ; F2 ; F3...) fait l'objet d'une notation de présence ou d'absence de la maladie (fréquence exprimée en pourcentage).

Correspondances feuilles visibles/feuilles définitives selon les stades :
(S. Désiré - FDGDON64)

Feuille déployée	Au stade 1 nœud BBCH31	Au stade 2 nœuds BBCH32	Au stade dernière feuille pointante BBCH37	Au stade dernière feuille étalée BBCH39
Cela correspond aux feuilles définitives suivantes :				
F1	F4	F3	F2	F1
F2	F5	F4	F3	F2
F3	F6	F5	F4	F3

Feuille pointante pas comptée car non encore déployée



Blé tendre d'hiver

Dép.	Commune	Date de semis	Variété	Stade	% septoriose F3	% septoriose F2	% septoriose F1
87	Limoges	02-oct	Sy Moisson				
23	Viersat	06-oct	Cellule/Absalon/Chevalier/Arezzo	2 nœuds	40	0	0
19	Eyburie	11-oct	Chevalier	DFP	70	0	0
23	Evaux Les Bains	13-oct	Absalon/Complice	1 nœud	30	/	/
87	Panazol	18-oct	Sy Moisson	2 nœuds	0	0	0
23	Ahun	16-oct	Absalon/Midas/Némo/Armada	2 nœuds	55	0	0
87	Flavignac	23-oct	Chevalier (SF)	2 nœuds	50	15	0
87	Mézière S/Issoire	24-oct	Arezzo				
23	Chambonchard	25-oct	Camp Rémy	2 nœuds	65	10	0
87	Feytiat	27-oct	Rubisko	2 nœuds	0	0	0
87	Janailhac	28-oct	Némo	2 nœuds	80	10	0
87	Aixe S/Vienne	02-nov	Energo	2 nœuds	10	0	0
23	Saint Pierre Le Bost	04-nov	Arezzo				
87	Saint Martin Le Vieux	07-nov	Arezzo	2 nœuds	70	0	0
87	Berneuil	09-nov	Chevignon	2 nœuds	10	0	0
87	Saint Yrieix La Perche	09-nov	Solehio/Pireneo				
87	Verneuil S/Vienne	15-nov	Midas				
87	Coussac-Bonneval	14-nov	Ephoros				

- **Septoriose** (fiche technique)

Observations du réseau :

Se reporter au tableau de synthèse présenté en introduction.

Parcelle à 1 nœud : septoriose présente sur F3

Parcelles à 2/3 nœuds : 80% des parcelles du réseau présentent des nécroses sur F3 dont 30% en présentent sur F2 (les situations dont les F2 sont affectées concernent des variétés sensibles).

Parcelle à « Dernière feuille pointante » : septoriose présente sur F3 (variété assez sensible).

Seule cette dernière a atteint le seuil d'indice de risque.

Modélisation (modèle PRESEPT) :

- Les taches actuellement visibles sont issues des contaminations occasionnées par les précipitations de début à mi-mars.
- Les taches occasionnées par les contaminations de la 1^{ère} semaine d'avril sont en cours de sortie.
- Les pluies de mi-avril ont contaminé toutes les feuilles du haut déployées à ce moment et les nécroses ne seront visibles que début mai.
- Quelques contaminations supplémentaires ont été engendrées par les précipitations des 20/04 et 21/04 mais très localisés selon les secteurs.

Tendance régionale du risque calculée par le modèle pour un semis du 10/10 et un autre du 25/10 (risque identique) :



Tendance régionale calculée par le modèle pour un semis du 10/10 et un autre du 25/10 (avec hypothèse d'un total de 20 mm jusqu'au 27/04 compris) :



Période de risque : du stade 2 nœuds (BBCH 32) à fin floraison (BBCH 69)

Seuil indicatif de risque :

Au stade 2 nœuds :

L'observation se fait sur la F2 déployée du moment (soit la F4 définitive) :

- Variétés sensibles : si plus de 20% des feuilles présentent des symptômes (4 feuilles sur 20).
- Variétés peu sensibles : si plus de 50% des feuilles présentent des symptômes.

A partir du stade dernière feuille pointante (BBCH 37) :

L'observation se fait sur la F3 déployée du moment (soit la F4 définitive) :

- Variétés sensibles : si plus de 20% des feuilles présentent des symptômes (4 feuilles sur 20).
- Variétés peu sensibles : si plus de 50% des feuilles présentent des symptômes.

Au-delà du stade dernière feuille étalée (BBCH 39) :

L'observation se fait sur la F3 définitive :

- Variétés sensibles : si plus de 20% des feuilles présentent des symptômes (4 feuilles sur 20).
- Variétés peu sensibles : si plus de 50% des feuilles présentent des symptômes.

Tableaux des sensibilités variétales à la septoriose du blé

Références		Les plus résistantes		Nouveautés et variétés récentes						
Résistante		LG ABSALON		KWS EXTASE						
		RGT CESARIO (ZALCO CS)		AMBOISE	CHEVIGNON	KWS DAKOTANA	LG ARMSTRONG	LUMINON	SANREMO	
	SYLLON	FRUCTIDOR (FORCALI)		GEDSER	MALDIVES CS	RGT CYSTEO	RGT PULKO	STROMBOLI		
Assez résistante				APOSTEL	PASTORAL	SOPHIE CS				
				TARASCON						
	TRIOMPH	SOLEHIO	PIBRAC	ALBATOR	CONCRET*	JOHNSON	LG ANDROID	MACARON	MUTIC*	
	RGT LIBRAVO	HYKING	BOREGAR	FANTOMAS	FILON*	JAIDOR	LIPARI	MAUPASSANT (METROPOLIS)		
	REBELDE	(MATHÉO)	CREEK	LEANDRE	SORTILEGE CS					
Moyennement résistante				ANNECY	LG ASCONA	MORTIMER	RGT GOLDENO*	TENOR		
	DESCARTES	COMPLICE (BOLOGNA)	ASCOTT	(ETANA)	FILIER	RGT SACRAMENTO	UNIK*			
	RGT VENEZIO	NEMO (DIAMENTO)	CELLULE*	SOLINDO CS						
			BERGAMO	(ALEPPO)	HYPODROM	ORLOGE	SEPIA	SOVERDO CS		
Assez sensible										
			ADVISOR	HYNICTUS (GEO)						
	RUBISKO		HYDROCK	RGT TALISKO	RGT VOLUPTO*					
Sensible										
			OREGRAIN	MAORI						
	SY MOISSON		APACHE							

() : à confirmer

Source : essais d'inscription (CTPS/GEVES) et de post-inscription (ARVALIS) 2016 - 2018, jusqu'à 49 en 2018
* : variétés observées plus sensibles vis-à-vis de certaines souches émergentes.

Évaluation du risque :

Des précipitations sont attendues pour les prochains jours et avec elles leur cortège de contaminations sur les étages foliaires déployés. La vigilance est de mise dès le stade « 2 nœuds » notamment sur variétés sensibles.

Oïdium (fiche technique)

Observations du réseau : toujours signalé sur tige et sur 50% des F3 sur Nemo (Janailhac)

Période de risque : à partir d'épi 1 cm.

Seuil indicatif de risque :

- Quelle que soit la sensibilité de la variété, si présence de 1 à 2 feutrages blancs, le risque est faible, mais à surveiller.
- Variété sensible : plus de 20% des plantes atteintes sur les étages foliaires supérieurs (3 dernières feuilles).
- Autres variétés : plus de 50% des plantes atteintes sur les étages foliaires supérieurs (3 dernières feuilles).

Tableaux des sensibilités variétales à l'oïdium du blé

Références		Les plus résistantes		Nouveautés et variétés récentes		
Résistant						
	RGT CESARIO	(APOSTEL)	JAIDOR	JOHNSON	LIPARI	(MV TOLDI)
	LG ABSALON	AMBOISE	LG ASCONA	MORTIMER	PASTORAL	SOLINDO CS
MATHEO	CREEK	KWS EXTASE	SANREMO			
SYLLON						
Assez résistant						
	FRUCTIDOR	ALBATOR	CHEVIGNON	KWS DAKOTANA	LG ANDROID	
SY MOISSON	ADVISOR	MAUPASSANT	SEPIA			
	RGT LIBRAVO	LG ARMSTRONG	MACARON	MUTIC	ORLOGE	TARASCON
		FILON	LUMINON			
Moyennement résistant						
	DIAMENTO	ETANA	PILIER	SORTILEGE CS		
RUBISKO	CELLULE ^E	CONCRET	RGT CYSTEO	RGT VOLUPTO	SOVERDO CS	
FORCALI						
TRIOMPH	COMPLICE	ANNECY	FANTOMAS	MAORI	(METROPOLIS) RGT TALISKO	
Assez sensible						
(TIEPOLO)	ASCOTT	HYPODROM ^E	RGT GOLDENO ^E			
BOLOGNA		GEO	LEANDRE			
REBELDE	ARKEOS	GEDSER	RGT PULKO	STROMBOLI		
HYKING		HYNVICIUS	RGT SACRAMENTO	SOPHIE CS		
IZALCO CS	NEMO					
Sensible						
	OREGRAIN ^E					
DESCARTES	BERGAMO	(ALEPPO)	HYDROCK	UNIK		
		MALDIVES CS	TENOR			

(^I) : à confirmer
^E : sensible sur épis

Source : essais pluriannuels inscription (CTPS/GEVES) et post-inscription (ARVALIS), jusqu'à 18 en 2018

Evaluation du risque :

Vigilance en raison du caractère explosif de cette maladie sur variétés sensibles. Les conditions seront toutefois moins favorables que ces derniers jours

- **Rouille jaune** ([fiche technique](#))

Cette maladie doit faire l'objet d'une surveillance dès « épi 1 cm » sur variété sensible.

Observations du réseau : pas encore signalée.

Période de risque : à partir d'épi 1 cm.

Seuil indicatif de risque :

- Au stade « épi 1 cm » (BBCH30) : présence de foyers actifs (plusieurs plantes contigües portant de nombreuses pustules pulvérulentes).
- A partir du stade 1 nœud (BBCH31) : dès les premières pustules.

Evaluation du risque :

Une attention particulière doit d'abord être portée sur les variétés identifiées comme sensibles présentées dans le bulletin précédent. Cependant des contournements de résistance ont été constatés ces dernières années sur des variétés réputées plus robustes.

Orge

Dép	Commune	Date de semis	Variété	Stade
23	Evaux Les Bains	12-oct	LG Casting	2 nœuds
87	Nexon	15-oct	Memento	DFE
23	Saint Chabrais	25-oct	LG Casting	DFP
87	Flavignac	26-oct	Memento	DFE
87	Saint Martin Le Vieux	04-nov	Amistar	Gonflement
23	Marsac	06-nov	LG Casting	DFP

- **Oïdium** ([fiche technique](#))

Observations du réseau :

Cette maladie est toujours signalée sous forme d'hypersensibilité (réaction de défense) ou pustules:

Flavignac : 40% des F2 et 50% des F3 + tige ; Saint Chabrais : 15% des F3 et 10% des F4 (Hypers.) ; Marsac : 10% des F3 et 10% des F4 ; Saint Martin le V. : 90% des F4 ; Nexon : 100% des F2 et F3 (hyper.).

Observations hors réseau :

De nombreux dégâts sont signalés sur Amistar et autres variétés sensibles

Période de risque : épi 1 cm à « Sortie des barbes » (BBCH 49).

Seuil indicatif de risque :

Plus de 20 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés sensibles sur un échantillon de 20 plantes. Valeur remontée à 50% sur variétés moyennement et peu sensibles.

Ne pas intervenir si seulement présence de 1 ou 2 feutrages ou présence uniquement à la base des tiges.

Se reporter au [bulletin N° 6 du 02/04/2019](#) pour les sensibilités variétales vis-à-vis de l'oïdium de l'orge.

Evaluation du risque :

La vigilance est impérative sur variétés sensibles.

- **Rhynchosporiose** ([fiche technique](#))

Observations du réseau :

Evaux les Bains : 30% des F3 et 60% des F4 ; Saint Chabrais : 10% des F4 ; Marsac : 20% des F3 et 60% des F4 ; Saint Martin Le vieux : 15% des F4

Période de risque : de 1 nœud (BBCH31) à « sortie des barbes » (BBCH49).

Seuil indicatif de risque :

- Plus de 10 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés sensibles sur un échantillon de 20 plantes.
- Plus de 25 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés moyennement à peu sensibles sur un échantillon de 20 plantes.

Les sensibilités variétales vis-à-vis de la Rhynchosporiose de l'orge sont présentées dans le [bulletin du 19/03/2019](#) :

Evaluation du risque :

La surveillance se poursuit sur variétés sensibles et sur les foyers déjà présents.

• **Helminthosporiose** (fiche technique)

Observations du réseau : Evaux les Bains : 40% des F3 et 60% des F4 ; Saint Chabrais : 5% des F2 et 25% des F3

Période de risque : de 1 nœud (BBCH31) à « sortie des barbes » (BBCH49).

Seuil indicatif de risque :

- Plus de 10 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés sensibles sur un échantillon de 20 plantes.
- Plus de 25 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés moyennement à peu sensibles sur un échantillon de 20 plantes.

Les sensibilités variétales vis-à-vis de l'helminthosporiose de l'orge sont présentées dans le [bulletin du 19/03/2019](#) :

Les taches d'helminthosporiose peuvent être comptabilisées en même temps que les taches de rhynchosporiose : si la somme des feuilles atteintes par l'une ou par l'autre des maladies dépasse 10 ou 25 % (selon les sensibilités variétales), le seuil est atteint.

Evaluation du risque :

La surveillance doit se poursuivre même s'il semble que cette maladie soit un peu en retrait cette année.

• **Rouille naine** (fiche technique)

Observations du réseau : non signalée cette semaine

Période de risque : De 1 nœud à « Gaine éclatée » (BBCH 47).

Seuil indicatif de risque :

- Plus de 10 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés sensibles sur un échantillon de 20 plantes.
- Plus de 50 % de la somme des F1+F2+F3 présentant des symptômes sur variétés moyennement à peu sensibles sur un échantillon de 20 plantes.

Se reporter au [bulletin N° 6 du 02/04/2019](#) pour les sensibilités variétales vis-à-vis de la rouille naine.

Evaluation du risque :

Surveillance des variétés sensibles.

• **Ramulariose** (fiche technique)

Observations du réseau : présence notée sur 20% des F1 et 40% des F2 à Nexon

Evaluation du risque :

A l'apparition des symptômes (généralement en fin de cycle), la maladie ne peut plus être contrôlée.

- **Taches brunes**

Toujours présentes à Flavignac et Saint Chabrais

Triticale

Dép	Commune	Date de semis	Variété	Stade
87	Saint Laurent Sur Gorre	22-oct	Vuka	
23	Sainte Feyre	30-oct	Kéréon	2 nœuds
87	Saint Laurent Les Eglises	25-oct	Vuka	
87	Rancon	01-nov	Vuka	
87	Coussac-Bonneval	05-nov	Vuka	
23	Bétête	16-nov	Vuka	2 nœuds

- **Oïdium** ([fiche technique](#))

Observations hors réseau : signalé sur Jokari

Période de risque : à partir d'épi 1 cm.

Seuil indicatif de risque :

- Variétés sensibles : plus de 20 % des feuilles atteintes.
- Autres variétés : plus de 50 % des feuilles atteintes.

Ne pas intervenir si seulement présence de 1 ou 2 feutrages ou présence uniquement à la base des tiges.

Evaluation du risque :

Surveillance impérative des variétés sensibles.

Se reporter au [bulletin N° 6 du 02/04/2019](#) pour les sensibilités variétales vis-à-vis de l'oïdium du triticale.

- **Rouille jaune** ([fiche technique](#))

Observations du réseau : 1^{er} signalement sur variété Kéréon à Sainte Feyre.

Période de risque : à partir d'épi 1 cm.

Seuil indicatif de risque :

- Au stade « épi 1 cm » (BBCH30) : présence de foyers actifs (plusieurs plantes contigües portant de nombreuses pustules pulvérulentes).
- A partir du stade 1 nœud (BBCH31) : dès les premières pustules.

Tableau des sensibilités variétales à la rouille jaune sur triticale :

Echelle de résistance à la rouille jaune SUR FEUILLE		Echelle de résistance à la rouille jaune SUR EPI (essais 2014)	
<i>Références</i>	<i>Nouveautés</i>		
Les plus résistants		Les plus résistants	
Traces		TRIBECA	TRISKELL
VUKA	JOKARI		TULUS
	BIKINI	(VUKA)	(AGOSTINO)
	RGT RUMINAC	KEREON	QUATREVENTS
Assez résistants	BREHAT		KWS FIDO
	RGT BMOUAC		EXAGON
			ORVAL
			KAULOS
Moyennement sensibles	KASYNO		TREFL*
	VOLKO		CYRKON*
	RGT KADJAC		SW TALENTO*
	VMER		
Sensibles	RAMDAM		
(GRANDVAL)			
(COSINUS)			
Très sensibles	RIVOLT		
KWS FIDO ^E			
KAULOS ^E			
	(TRICANTO)		
Les plus sensibles		Les plus sensibles	
<small>E : sensible sur épis</small>		<small>* : plus sensible sur épis que sur feuille</small>	
<small>P : plus sensible au stade jeune qu'au stade adulte</small>		<small>() : à confirmer</small>	
<small>Source : essais pluriannuels inscription (CTPS/GEVES) et post-inscription (ARVALIS et partenaires)</small>		<small>Source : 6 essais 2014</small>	

Evaluation du risque :

Une attention particulière doit d'abord être portée sur les variétés identifiées comme sensibles présentées dans le tableau ci-dessus.

• **Rhynchosporiose**

Observations du réseau : 5% des F4 à Bétête

Se reporter au bulletin N° 7 du 09/04/2019 pour les sensibilités variétales vis-à-vis de la rhynchosporiose du triticale.

• **Septorioses, Aschochyte, Microdochium**

Observations du réseau : Sainte Feyre : 10% des F3 et 30% des F4

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil indicatif validé par de l'expérimentation concernant le complexe rhynchosporiose – Septoriose – Ascochyta.

Aucune grille de sensibilité variétale n'est proposée pour le moment.

Prochain bulletin : le mardi 30 avril 2019

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON Limousin, les Chambres d'Agriculture 23 et 87, NATEA, Agricentre Dumas, Ets FAURE SAS, Sébastien PINTHON (agriculteur), EPLEFPA Limoges, EPLEFPA Saint Yrieix La Perche, EPLEFPA d'AHUN.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l'Ecologie, avec l'appui financier de l'Agence Française de Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto "